

АО «ОТИСИФАРМ»

ГЕНФЕРОН® ЛАЙТ

14 ЛЕТ

Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ

50 000 МЕ/мл

1+ МЕСЯЦ

Лечение гриппа и ОРВИ

10 000 МЕ/мл

ЭКСТРЕННАЯ ПОСТКОНТАКТНАЯ* ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ

ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ У ДЕТЕЙ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ

ИНТРАНАЗАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА РЕКОМЕНДОВАНЫ МЗ РФ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ COVID

* Экстренно-постконтактная профилактика используется в качестве профилактики при контакте с инфицированным человеком. 1. Применять в экстренно-постконтактной профилактике при контакте с заболевшим РФ. Профилактика, эффективность и безопасность при контакте с инфицированным COVID-19, версия 9 от 26.10.2020. ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АРБИДОЛ® УМИФЕНОВИР

Для **ПОСТКОНТАКТНОЙ** профилактики **ОРВИ**, включая **ЭКСТРЕННУЮ** профилактику **МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ¹**

В разовой дозе **1 раз в день²**

10-14 дней

ВОЗМОЖНЫ ПОВТОРНЫЕ КУРСЫ

1. В соответствии с временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", версия 9 от 26.10.2020 г. в схему постконтактной профилактики у лиц при единичном контакте с подтвержденным случаем COVID-19, включая медицинских работников, включены в том числе рекомендациями ВИМН в сочетании с умифеновиром. 2. В зависимости от возраста.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АМИКСИН® 125 мг

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ

1 ТАБЛЕТКА В НЕДЕЛЮ 6 НЕДЕЛЬ

1 ТАБЛЕТКА В НЕДЕЛЮ 6 НЕДЕЛЬ

Для лиц старше 18 лет

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

